

fitobiet

**Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero in
formulazione di microgranuli dispersibili**

COMPOSIZIONE

- Metamitron puro gr. 70
- coadiuvanti q.b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

OFFICINA DI PRODUZIONE:

COLLAG TECHNOLOGY CENTRE
Hazel Road
Woolston
Southampton
SO19 7GB
Inghilterra

REGISTRAZIONE N. 9762 DEL 30.10.98 DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

fitobiet

CAMPI, DOSI E MODALITA D'IMPIEGO

Prodotto diserbanti che è in formulazione di microgranuli dispersibili, che agisce per assorbimento radicale e fogliare inibendo la fotointesi clorofilliana. Viene indicato contro le seguenti infestanti : Alopecurus myosuroides, Avena spp., Amaranthus spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis spp., Stachys annua, Diplotaxis spp., Myagrum spp., Capsella bursa – pastoris, Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum aviculare, Phalaris spp., Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica spp., Polygonum convolvulus ecc.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

- pre-semina

kg 3-5 per ettaro in 400lt di acqua con interrimento del prodotto e dose maggiore in terreni tendenzialmente pesanti

- post-emergenza

kg 0,5 – 1 per ettaro miscelato con il p.a. Fenmedifam in 200 lt di acqua e trattando con piantine di bietole nello stadio delle 2-4 foglie vere.

Nel caso si debba intervenire in trattamenti piu' tardivi impiegare kg 1,5 – 2 di prodotto in miscela con lt. 2-3 di Fenmedifam e con l'aggiunta di litri 0,5 – 1 di olio bianco.

NB : si raccomanda di effettuare il trattamento con assenza di vento e con terreno be lavorato e quindi sminuzzato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulanti deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VERDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)